

KÜMELER

Canlı yada cansız varlıkların oluşturduğu iyi tanımlanmış nesneler topluluğuna küme denir.

iyi tanımlanmış herkes tarafından kabul edilen

Örnek:

✓ Kilis'in ilçeleri

Küme oluşturur. Çünkü Kilis'in üç tane ilçesi vardır. Bunlar {Polateli, Musabeyli, Elbeyli}

✓ Türkiye'nin en güzel şehri

Küme oluşturmaz. Çünkü Türkiye'nin en güzel şehri kişiden kişiye göre değişeceğinden küme oluşturmaz.

✓ Uçan inekler

küme oluşturur. Çünkü uçan inek olamaya-
cağından bu kümemiz boş kümedir.

Kümenin özellikleri

- Kümeler genellikle A , B , C gibi büyük harflerle gösterilir.
- Kümeyi oluşturan öğelere, kümenin elemanı denir. a elemanı A kümesine ait ise, $a \in A$ biçiminde yazılır. " a , A kümesinin elemanıdır." diye okunur. b elemanı A kümesine ait değilse, $b \notin A$ biçiminde yazılır. " b , A kümesinin elemanı değildir." diye okunur.
- Kümede, aynı eleman bir kez yazılır.
- Elemanların yerlerinin değiştirilmesi kümeyi değiştirmez.
- A kümesinin eleman sayısı $s(A)$ yada $n(A)$ ile gösterilir.

B. KÜMELERİN GÖSTERİLİŞİ

Kümenin elemanları aşağıdaki 3 yolla gösterilebilir.

1. Liste Yöntemi

Kümenin elemanları $\{ \}$ sembolü içine, her bir elemanın arasına virgül konularak yazılır.

$A = \{a, b, \{a, b, c\}\}$ ise, $s(A) = 3$ tür.

2. Ortak Özellik Yöntemi

Kümenin elemanlarını, daha somut ya da daha kolay algılanır biçimde gerektiğinde sözel, gerektiğinde matematiksel bir ifade olarak ortaya koyma biçimidir.


$A = \{x : (x \text{ in özelliği})\}$

Burada " $x :$ " ifadesi "öyle x lerden oluşur ki" diye okunur.

Bu ifade " $x |$ " biçiminde de yazılabilir.

3. Venn Şeması Yöntemi

Küme, kapalı bir eğri içinde her eleman bir nokta ile gösterilip noktanın yanına elemanın adı yazılarak gösterilir. Bu gösterime Venn Şeması ile gösterim denir.



C. KÜME ÇEŞİTLERİ

a) Eşit küme, Denk küme

Aynı elemanlardan oluşan kümelere eşit kümeler denir. Eleman sayıları eşit olan kümelere denk kümeler denir.

A kümesi B kümesine eşit ise $A = B$,
 C kümesi D kümesine denk ise $C \equiv D$
biçiminde gösterilir.

Eşit olan kümeler aynı zamanda denktir. Fakat denk kümeler eşit olmayabilir.

b) Boş küme

Hiç bir elemanı olmayan kümeye boş küme denir.

Boş küme $\{ \}$ ya da $\emptyset$ sembolleri ile gösterilir.

Not:

$\{0\}$ ve $\{\emptyset\}$ kümeleri boş küme değildir.

c) Alt Küme

A kümesinin her elemanı, B kümesinin de elemanı ise A ya B nin alt kümesi denir.

A kümesi B kümesinin alt kümesi ise $A \subset B$ biçiminde gösterilir.

A kümesi B kümesinin alt kümesi ise B kümesi A kümesini kapsıyor denir. $B \supset A$ biçiminde gösterilir.

C kümesi D kümesinin alt kümesi değilse $C \not\subset D$ biçiminde gösterilir.

Örnek:

$A = \{a, b, \{c\}, \{d, e\}\}$ kümeleri veriliyor.

I. $a \in A$

II. $c \notin A$

III. $\{d, e\} \subset A$

IV. $\{\{c\}\} \subset A$

V. $a \subset A$

yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

2. ÖZALT KÜME

Bir kümenin, kendisinden farklı bütün alt kümelerine o kümenin özalt kümeleri denir.

3. ALT KÜMENİN ÖZELLİKLERİ

I. Her küme kendisinin alt kümesidir.

$$A \subset A$$

II. Boş küme her kümenin alt kümesidir.

$$\emptyset \subset A$$

III. $A \subset B$ ve $B \subset A \Leftrightarrow A = B$

IV. $A \subset B$ ve $B \subset C \Leftrightarrow A \subset C$

V. n elemanlı bir kümenin alt küme sayısı 2^n dir.

VI. n elemanlı bir kümenin özalt küme sayısı $2^n - 1$ dir.

VII. n elemanlı bir kümenin r elemanlı alt küme sayısı

$$\binom{n}{r} = \frac{n!}{(n-r)! \cdot r!}$$

Örnek:

$$A = \{a, b, c\}$$

kümesinin kaç tane alt kümesi vardır?

Çözüm:

I. yol:

0 elemanlı

$\emptyset$

1 elemanlı

$\{a\}, \{b\}, \{c\}$

2 elemanlı

$\{a, c\}, \{a, b\}, \{b, c\}$

3 elemanlı

$\{a, b, c\}$

toplam 8 tane dir.

II. yol:

3 elemanlı bir kümenin alt küme sayısı $2^3 = 8$ dir.

III. yol:

pascal üçgeni

			1		
		0 elemanlı			
	1		1		
	0 elemanlı		1 elemanlı		
	1	2	1		
	0 elemanlı	1 elemanlı	2 elemanlı		
1	3	3	1		
0 elemanlı	1 elemanlı	2 elemanlı	3 elemanlı		
1	4	6	4	1	
0 elemanlı	1 elemanlı	2 elemanlı	3 elemanlı	4 elemanlı	

bu tablodan 3 elemanlı bir kümenin eleman sayısını $1+3+3+1=8$ buluruz.

Örnek:

4 elemanlı bir kümenin 2 elemanlı alt kümesi sayısı kaçtır?

Çözüm:

I. yol:

$$\binom{4}{2} = \frac{4!}{(4-2)! \cdot 2!} = \frac{24}{2 \cdot 2} = \frac{24}{4} = 6$$

II. yol:

pascal üçgenine bakarız.

			1		
		4			
		6			
		4			
	1		4		
0 elemanlı	1 elemanlı	2 elemanlı	3 elemanlı	4 elemanlı	

tablodan 4 elemanlı bir kümenin 2 elemanlı alt küme sayısının 6 olduğunu görürüz.

Örnek:

$M \not\subset N$ olmak üzere,

$$M \cap N = \{a, b, c, d\}$$

olduğuna göre, M kümesinin alt kümelerinin sayısı en az kaçtır?

- A) 8 B) 16 C) 32 D) 64 E) 128

Örnek:

$$M = \{1, 2, 3, 6, 7, 8\}$$

$$N = \{2, 3, 6, 9, 10\}$$

M kümesinin alt kümelerinden kaç tanesi N kümesinin de alt kümesidir?

- A) 4 B) 8 C) 16 D) 32 E) 64

Örnek:

$$A = \{1, 2, \{3\}, 4, \{5, 6\}\}$$

kümesi veriliyor.

- I. $3 \in A$
II. $\{5\} \subset A$
III. $\{1, 2\} \subset A$
IV. $\{5, 6\} \in A$
V. $s(A) = 5$
VI. $\{\{3\}\} \subset A$

Yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

Örnek:

A kümesinin alt kümelerinin sayısı, B kümesinin alt küme sayısının 8 katı ve A kümesi ile B kümesinin eleman sayısı toplam 11 dir.

Buna göre, A kümesinin eleman sayısı aşağıdakilerden hangisidir?


- A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

F. KÜMELERLE YAPILAN İŞLEMLER

1. Kümelerin Birleşimi

A nın elemanlarından veya B nin elemanlarından oluşan kümeye bu iki kümenin birleşim kümesi denir ve $A \cup B$ biçiminde gösterilir.

$$A \cup B = \{x: x \in A \text{ veya } x \in B\} \text{ dir.}$$





Birleşim İşleminin Özellikleri

- I. $A \cup \emptyset = A$
II. $A \cup A = A$
III. $A \cup B = B \cup A$
IV. $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$
V. $A \subset B$ ise, $A \cup B = B$
VI. $A \cup B = \emptyset$ ise, $(A = \emptyset \text{ ve } B = \emptyset)$


2. Kümelerin Kesişimi

A ve B kümesinin ortak elemanlarından oluşan kümeye A ile B nin kesişim kümesi denir ve $A \cap B$ biçiminde gösterilir.

$$A \cap B = \{x: x \in A \text{ ve } x \in B\}$$



$C \cap D = \emptyset$
 C ve D ayrık kümelerdir.




$$F \subset E \Rightarrow F \cap E$$

Kesişim İşleminin Özellikleri

- I. $A \cap \emptyset = \emptyset$
- II. $A \cap A = A$
- III. $A \cap B = B \cap A$
- IV. $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
- V. $(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$
- VI. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

G. EVRENSEL KÜME

Üzerinde işlem yapılan, bütün kümeleri kapsayan kümeye, evrensel küme denir. Evrensel küme genellikle E ile gösterilir.



$$A \cap E = A$$
$$A \cup E = E$$

H. BİR KÜMENİN TÜMLEYENİ

Evrensel kümenin elemanı olup, A kümesinin elemanı olmayan elementlerden oluşan kümeye A nın tümleyeni denir ve A^t, A' yada $\bar{A}$ ile gösterilir.

$$\bar{A} = \{x: x \in E \text{ ve } x \notin A, A \subseteq E\}$$


Tümleyenin Özellikleri

- i) $\bar{\bar{E}} = \emptyset$
- ii) $\bar{\emptyset} = E$
- iii) $\bar{(\bar{A})} = A$
- iv) $A \cup \bar{A} = E$ ve $A \cap \bar{A} = \emptyset$ dir.
- v) $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$
- vi) $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$
- vii) $E \cup \bar{A} = E$ ve $E \cap \bar{A} = \bar{A}$ dir.
- viii) $A \subset B$ ise, $\bar{B} \subset \bar{A}$ dir.

E. FARK İŞLEMİ

A kümesinde olup, B kümesinde olmayan elemanların kümesine A fark B kümesi denir. A fark B kümesi $A - B$ ya da $A \setminus B$ biçiminde gösterilir.

$$A - B = \{x: x \in A \text{ ve } x \notin B\}$$



Farkla İlgili Özellikler

A, B, C kümeleri E evrensel kümesinin alt kümeleri olmak üzere,

- I. $E - A = \bar{A}$
- II. $E - A = A \cap \bar{B}$
- III. $\overline{A - B} = \bar{A} \cup B$

Örnek:

$$K = \{1, 4, 5\}$$

$$L = \{2, 4, 6\}$$

$$M = \{2, 3, 4, 7\}$$

olduğuna göre, $K \setminus (L \setminus M)$ kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\emptyset$ B) $\{7\}$ C) $\{3, 7\}$
D) $\{1, 4, 5\}$ E) $\{6\}$

BİRLEŞİM KÜMESİNİN ELEMAN SAYISI

A, B, C herhangi birer küme olmak üzere,

- I. $s(A \cup B) = s(A) + s(B) - s(A \cap B)$
- II. $s(A \cup B) = s(A/B) + s(B/A) + s(A \cap B)$

Örnek:

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$A \cap B = \{3\}$$

$$A - B = \{1, 4, 5\}$$

olduğuna göre, B kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\{2, 3, 5\}$ B) $\{1, 4, 5\}$ C) $\{1, 2, 3\}$
D) $\{2, 3\}$ E) $\{2\}$


Örnek:

$$(A \cup B) \setminus [(A \setminus B) \cup (B \setminus A)]$$

ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

- A) A B) B C) $A \cap B$
D) $A \setminus B$ E) $B \setminus A$

KÜME PROBLEMLERİ



Tenis veya voleybol oynayanların sayısı:

$$s(T \cup V) = a + b + c$$

Tenis ya da voleybol oynayanların sayısı:

$$s(T - V) + s(V - T) = a + c$$

Sadece tenis oynayanların sayısı:

$$s(T - V) = a$$

Tenis oynamayanların sayısı:

$$s(\overline{T}) = c + d$$

Bu iki oyundan en az birini oynayanların sayısı:

$$s(T \cup V) = a + b + c$$

Bu iki oyundan en çok birini oynayanların sayısı:

$$\begin{aligned} s(\overline{A \cap B}) &= d + a + c \\ s(\overline{A \cup B}) + s(T - V) + s(V - T) &= d + a + c \end{aligned}$$

Bu iki oyundan hiç birini oynamayanların sayısı:

$$s(\overline{A \cup B}) = d$$

Örnek:

Bir sınıfta, hem basketbol hem voleybol oynayanların sayısı 7, voleybol veya basketboldan en az birini oynayanların sayısı 16'dır. Basketbol oynayanların sayısı, voleybol oynayanlardan 5 fazla olduğuna göre, bu sınıfta basketbol oynayan kaç kişidir?

- A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14

Örnek:

Sınıfta Almanca veya Fransızca dillerinden en az birini bilen 40 öğrenci vardır. Almanca bilenlerin sayısı, Fransızca bilenlerin sayısının 2 katı, her iki dili bilenlerin sayısının ise 4 katıdır. Buna göre, sınıfta Almanca bilenlerin sayısı kaçtır?

- A) 18 B) 20 C) 24 D) 30 E) 32

Örnek:

Bir sınıfta öğrencilerden 35'i İngilizce, 33'ü Almanca kursuna gidiyor. Bunlardan 15'i her iki kursa da gittiğine göre, bu sınıfta bu kurslara katılan öğrencilerin tümü kaç kişidir?

- A) 50 B) 53 C) 68 D) 76 E) 83

ALİŞTIRMALAR

- 1) $A = \{x \mid 1 \leq x \leq 1200, x=4n, n \in \mathbb{N}\}$
 $B = \{y \mid 8 < y < 900, y=6k, k \in \mathbb{N}\}$
 olduğuna göre, $A \cap B$ nin eleman sayısı kaçtır?

A) 64 B) 66 C) 68 D) 70 E) 74

- 2) Boş kümeden farklı A ve B kümeleri için
 $3.s(A-B)=4.s(A \cap B)=5.s(B-A)$
 olduğuna göre, $A \cup B$ kümesinin eleman sayısı en az kaçtır?

A) 12 B) 27 C) 35 D) 47 E) 60

- 3) A ve B kümeleri E evrensel kümesinin alt kümeleri olmak üzere,

$$s(E)=12,$$

$$s(A \setminus B)=4,$$

$$s(A' \cap B')=3$$

- olduğuna göre, B kümesinin eleman sayısı kaçtır?

A) 2 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

- 4) Kesişimleri boş küme olmayan M ve N kümeleri için,

$$s(N)=4.s(M)$$

$$s(N \setminus M)=5.s(M \setminus N)$$

- olduğuna göre, N kümesi en az kaç elemanlıdır?

A) 12 B) 16 C) 18 D) 20 E) 24

- 5) $A = \{1, 2, 3\}$
 $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$
 $A - B = \{1, 3\}$

- olduğuna göre, B kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\{5\}$ B) $\{4, 5\}$ C) $\{3, 4, 5\}$
 D) $\{3, 4\}$ E) $\{1, 3, 5\}$

- 6) En az birer elemanı bulunan farklı A ve B kümeleri

$$(A-B) \cup B=A$$

- eşitliğini gerçekliyorsay bu kümeler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) $B \subset A$ B) $A \subset B$ C) $A \cap B = \emptyset$
 D) $A \cup B = B$ E) $(A \cup B)' = B'$

- 7) A ve B herhangi iki kümedir. $A \cup B$, $A \cap B$ ve $A-B$ kümelerinin tüm alt kümeleri sayırları sıra ile 128, 1, 8 olduğuna göre $B-A$ kümesinin eleman sayısı nedir?

A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3

- 8) A ve B gibi iki cümleden A'nın bir, B'nin iki elemanı $A \cap B$ cümlesinin elemanı değildir. $\emptyset$ dışında $A \cap B$ nin alt cümleleri sayısı 63 olduğuna göre, $A \cup B$ cümlesinin alt cümleleri sayısı kaçtır?

A) 512 B) 1024 C) 1128 D) 1256 E) 2048

- 9) 25 kişilik bir grupta basketbol veya futbol oyunlarından en az birini oynayanların sayısı 19, en çok birini oynayanların sayısı 16 olduğuna göre, yalnız bir oyun oynayanların sayısı kaçtır?

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10


- 10) Herkesin İngilizce ve almanca dillerinden en az birini bildiği bir sınıftaki öğrencilerin % 60 ı İngilizce, % 70 i almanca dillerini konuşuyor. Sınıfta her iki dili konuşan öğrenci sayısı 18 olduğuna göre, sınıfta kaç öğrenci vardır?

A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80

11) 34 kişilik bir grup, İngilizce, Fransızca hem İngilizce hem Fransızca bilen ya da hiç birini bilmeyen kişilerden oluşmaktadır. Bu grup da İngilizce bilmeyenlerin sayısı 12 dir. İngilizce veya Fransızcadan en çok birisini bilenlerin sayısı 26 ve Fransızca bilmeyenlerin sayısı 21 olduğuna göre hiç birini bilmeyenlerin sayısı kaçtır?

- A) 11 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4

12)



Şekildeki taralı bölgeyi aşağıdakilerden hangisi ifade eder?


- A) $[(A \cap C) \setminus B] \cup [B \setminus (A \cup C)]$
 B) $[B \setminus (A \cup C)] \cup [B \setminus (A \cap C)]$
 C) $[B \cup (A \cap C)] \cup [(A \cup C) \setminus B]$
 D) $[B \setminus (A \cap C)] \cup [(A \cup C) \setminus B]$
 E) $[(A \setminus C) \cup (B \setminus C) \cup [(A \cap C) \setminus B]]$

13)

İki basamaklı doğal sayılardan kaç tanesi 4 ve ya 6 ile tam bölünür?

- A) 8 B) 22 C) 29 D) 33 E) 37

14)



Yukarıda verilen şemaya göre,

$$[A \cap (\overline{B \setminus A})] \cup (E \cap \overline{B})$$

kümesinin eleman sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

15)

A – B kümesinin öz alt küme sayısı 7, B – A kümesinin özalt küme sayısı 15 ve $A \cup B$ kümesinin özalt küme sayısı 255 dir.

Buna göre, $A \cap B$ kümesinin özalt küme sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 7

16)

A kümesinin 2 elemanlı alt kümelerinin sayısı 5 elemanlı alt kümelerinin sayısına eşittir.

Buna göre, A kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinin sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 70 B) 35 C) 30 D) 24 E) 18

17)

$$A = \{x \mid 150 < x \leq 1000, x = 3m, m \in \mathbb{N}\}$$

$$B = \{x \mid 100 < x < 900, x = 5n, n \in \mathbb{N}\}$$

olduğuna göre, $A \cap B$ kümesinin eleman sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 42 B) 45 C) 48 D) 49 E) 50

18)

A, B ve C ayrık kümeleri aynı evrensel kümenin alt kümeleridir.

$$A \cup B \cup C = E$$

$$s(A') = 24$$


$$s(B') = 22$$

$$s(C') = 26$$

olduğuna göre, $s(A)$ aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 E) 18

19)



Yukarıdaki şekilde taralı alan 14 cm^2 , A bölgesinin alanı 19 cm^2 , B bölgesinin alanı 23 cm^2 dir.

Buna göre, A ve B nin sınırladığı bölgenin alanı kaç cm^2 dir?

- A) 24 B) 26 C) 28 D) 32 E) 42

20)

A = {Satranç oynayan öğrenciler}

B = {Erkek öğrenciler}

C = {Kız öğrenciler}

D = {Masa tenisi oynayan öğrenciler}

olduğuna göre, $(B \cup C) - (A \cap D)$ kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) {Satranç ve masa tenisi oynayan erkek öğrenciler}
B) {Satranç veya masa tenisi oynayan öğrenciler}
C) {Satranç ve masa tenisi oynayan öğrenciler}
D) {Satranç ve masa tenisi oynamayan öğrenciler}
E) {Satranç veya masa tenisi oynamayan öğrenciler}

21)

A ve B iki küme olmak üzere,

$$s(A \setminus B) = 8$$

$$s(A \cap B) = 3 \cdot s(B \setminus A)$$

$$s(A) + s(B) = 57$$

olduğuna göre, $s(A \cap B)$ aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 7 B) 8 C) 14 D) 15 E) 21

22)

Bir sınıftaki 46 öğrenciden 26 sı Matematik, 14 ü Fizik, 18 i Kimya dersinden, 4 öğrenci de hem Matematik hem Fizik hem de Kimya dersinden başarılı olmuştur.

Hiçbir dersten başarılı olmayan 4 öğrenci olduğuna göre, sadece iki dersten başarılı öğrenci sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

23)

A ve B kümeleri E evrensel kümesinin alt kümesidir.

$$s(E) = 19$$

$$s(\overline{A \cup B}) = 4$$

$$s(\overline{B}) = 7$$

$$s(A - B) = s(B - A) - 2$$

olduğuna göre, $s(A \cap B)$ aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

24)

Bir kümenin eleman sayısı 3 azaltıldığında alt küme sayısı 224 azalmaktadır.

Buna göre, bu kümenin eleman sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

25)

$$A \cap B \neq \emptyset$$

$$s(A) = 2x + 3$$

$$s(B) = 4x - 4$$

$$s(A \cap B) = 6 - x$$

olduğuna göre, $s(A \cup B)$ nin en küçük değeri aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

26)

$$A \cap B = \{1, 2, 3\}$$

$$A \cap C = \{3, 4, 5\} \text{ olduğuna göre,}$$

$A \cap (B \cup C)$ kümesinin alt küme sayısı kaçtır?

- A) 128 B) 64 C) 32 D) 16 E) 8

27)

A, B ve C kümeleri, E evrensel kümesinin alt kümeleridir.

$$s(A) + s(C') = 14$$

$$s(B) + s(A') = 16$$

$$s(C) + s(B') = 15$$

olduğuna göre, $s(E)$ kaçtır?

- A) 12 B) 14 C) 15 D) 16 E) 28